

PLAN DE ABONADO

AGUACATE

Abonado Riego por goteo: (inicio floración hasta maduración de fruto)

INICIO FLORACIÓN: 6 semanas: A: **LIGNOSER NPK 10-5-2** a 83 Lt/Ha y semana + **LIGNOSER NPK 8-4-16** a 42 Lt/Ha y semana + **LIGNOSER CALCIO** a 30 Lt/Ha (1 aportación única en esta fase)
Complementar esta fase con tratamientos foliares de Zinc + **SERSTIM** a 100 c.c. / 100 Lt

FASE DE ENGORDE: 8 semanas: B: **LIGNOSER NPK 8-4-16** a 40 Lt/Ha y semana + **LIGNOSER NPK 10-5-2** a 40 Lt/Ha y semana + **FOSFIER** a 6 Kg/Ha y semana + **LIGNOSER CALCIO** a 30 Lt/Ha y aportación (2 aportaciones en esta fase)

FASE DE MADURACIÓN: hasta final de ciclo: C: **LIGNOSER NPK 10-5-2** a 20 Lt/Ha y semana + **LIGNOSER NPK 8-4-16** a 60 Lt/Ha y semana + **LIGNOSER CALCIO** a 30 Lt/Ha y aportación (2-3 aportaciones en esta fase)

B: **LIGNOSER NPK 8-4-16** a 6 Lt/Ha y semana + **FOSFISER** a 6 Kg/Ha y semana + **AMINOSER** a 10 Lt/Ha y semana

AL FINAL DEL CICLO: D: **LIGNOSER** a 200 Lt/Ha

PREVENCIÓN PHYTOPHTORA Y PODREDUMBRE DE CUELLO: En cada una de las fases: **FUNGISER** a 20 Lt/Ha

APORTE DE HIERRO Y MICROELEMENTOS: **SEQUESTER AMINO 13** a 75 g/planta y año
SERMIX PLUS a 50 g/planta y año

TRATAMIENTOS FOLIARES: Arañas, Cochinilla, Negrilla:
SULFISER a 300 c.c./ 100 Lt
JABÓN POTÁSICO a 250 c.c./100 Lt

