PLAN DE ABONADO (i) ZANAHORIA

RECOMENDACIONES GENERALES:

Las zanahorias son poco tolerantes a la salinidad y mucho menos cuando son pequeñas.
El pH debe estar alrededor de 6, y máximo 7.
Un exceso de nitrógeno puede dañar el rendimiento y la calidad del producto.
El fósforo es muy importante en todo el cultivo y el Potasio según la fase fenológica.
La disponibilidad de Potasio suele ser baja en suelos arenosos, donde aparecen problemas.
En suelos alcalinos con bajos niveles de Materia Orgánica pueden presentarse problemas de Zinc.

ABONADO FERTIRRIGACIÓN

Para suelos medios EC 0,60,
En Fertirrigación o riego por aspersión, desde EMERGENCIA hasta MEDIADOS DE CICLO, alternar A y B

A: LIGNOSER NPK 10-5-2 a 1,5 Lt/1000m2 + LIGNOSER NPK 5-10-5 a 1,0 Lt/ 1000m2

B: LIGNOSER NPK 8-4-16 a 1,5 Lt/1000m2 + LIGNOSER NPK 5-10-5 a 1,0 Lt/ 1000m2

Una vez por semana LIGNOSER a 20 Lt/ Ha

Desde MEDIADOS DE CICLO hasta la RECOLECCIÓN, alternar A y B :

A: LIGNOSER NPK 8-4-16 a 1,5 Lt/1000m2 + POTASER a 400 c.c. / 1000 m2

B: LIGNOSER NPK 10-5-2 a 1,5 Lt/1000 m2 + POTASER a 600 c.c/ 1000 m2

Una vez por semana LIGNOSER a 20 Lt/ Ha

APLICACIÓN FOLIAR

Alternar A y B :

A: AMINOSER MIX a 250 c.c./100 Lt + ALGASER a 100 c.c. / 100 Lt

B: SERSTIM a 100 c.c./100 Lt + AMINOSER P a 100 g/100 Lt





PLAN DE ABONADO (ii) ZANAHORIA

PREVENCIÓN ENFERMEDADES:

Enfermedades de suelo:

Pythium, Phytophtora, Rhizoctonia:

3 aplicaciones de FUNGISER a 15 Lt/ Ha

Nemátodos: 4 aplicaciones de NEMASER

Primera a 40 Lt/ Ha una semana después de brotación

2ª,3ª,4ª a 30 Lt/ Ha durante el resto del cultivo.

PREVENCIÓN HONGOS:

Mildiu velloso: altenar aplicaciones de A yB

A: CUPROSER a 200-300 c.c./ 100 Lt

B: FOSFISER a 250 g/ 100 Lt

Manchas en la hoja (Cercospora, Alternaria, etc..):

SULFISER a 250-300 c.c/ 100 Lt

Estos tratamientos de prevención de hongos pueden aplicarse junto con los abonos alternando CUPROSER, FOSFISER y SULFISER



