Guía de fertilización Tomate

Producción convencional



Plan de preparación y mejora del suelo (Hongos y nematodos)

Aplicar el día anterior al trasplante

- NEMASER 20 L / Ha
- FUNGISER HG 20 L / Ha

Trasplante

Primer riego (Única aplicación)

- AGILUS BIO 1 L + 200 L agua / Ha

Segunda semana (Única aplicación)[1]

- RADIXER 10 L/ Ha

Primer ramillete floral

Primer riego

- ECOSER 1 L / Ha
- ECOSER P 2 L / Ha
- MAGSER HG-L 2 L / Ha
- SERLAC 3 L / Ha

Segundo riego

- ECOSER 1 L / Ha
- ECOSER P 2 L / Ha
- MAGSER HG-L 2 L / Ha
- SERLAC 3 L / Ha

Tercer riego cada 7 días

12 horas antes del riego mezclar [2]

- LIGNOSER 20 L / Ha
- FUNGISER MICRO (En caso de predominancia fúngica) 50 cc / Ha
- NEMASER MICRO (En caso de predominancia de nematodos) 50 cc / Ha

Luego proceder como habitualmente con los siguientes productos

- CALCISER HG-L 9 L / Ha
- ECOSER N 3 L / Ha
- SERMIX PLUS 5 Kg /Ha

[1] Se recomienda realizar una segunda aplicación luego de comenzar la recolección.

[2] Este paso es importante para asegurar la efectividad de FUNGISER MICRO.



A partir del cuarto ramillete

Primer riego

- ECOSER 1 L / Ha
- ECOSER P 2 L / Ha
- MAGSER HG-L 2 L / Ha
- SERLAC 3 L / Ha

Segundo riego

- ECOSER 1 L / Ha
- ECOSER N 3 L / Ha
- ECOSER K 5 L / Ha
- MAGSER HG-L 2 L / Ha
- SERLAC 3 L / Ha

Tercer riego (cada 7 días)

12 horas antes del riego mezclar

- LIGNOSER 20 L / Ha
- FUNGISER MICRO (En caso de predominancia fúngica) 50 cc / Ha
- NEMASER MICRO (En caso de predominancia de nematodos) 50 cc / Ha

Luego proceder como habitualmente con los siguientes productos

- CALCISER HG -L 9 L / Ha
- ECOSER N 3 L / Ha
- SERMIX PLUS 5Kg / Ha

15 días antes de la recolección

- BROOMSER 600 cc / Ha
- SERCOLOR 1 L / Ha



Control de en casos especiales

Larvas

Aplicación foliar

- KINGSER 400 cc / Hl

Pulgones

Aplicación foliar

- SERACE 400 cc / Hl

Arañas

Aplicación foliar

- JACKSER 400 cc / Hl

Trips

- QUEENSER 400 cc / Hl
- SERZYME 80 gr / Hl

Insectos en general

- PROTENDO 1 L + 1 L ACTIVE ON / Ha
- SULFISER HG-L 350 cc / Hl

Botrytis, Mildiu, Alternaria, Oidio, Roya, Etc.

Combinación sugerida 1

- BOTRIMAX 200 cc / Hl
- OIMISER 50 gr / Hl

Combinación sugerida 2

- MIBOSER de 80 a 150 cc / Hl
- BIOTYL 200 cc / Hl

Bacterias

- CUPROSER BAC 200 gr / Hl

Virus

- SERLAC V 500 cc / Hl
- SERLAC V EXTREME (casos más graves) 500 cc / Hl
- AMINOLAC BET 200 cc / Hl