

Cultivos con más de 3 años - Abonado por fertirrigación

A la salida del invierno **LIGNOSER** a 150 Lt/Ha

Antes de la floración **LIGNOSER NPK 10-5-2** a 20 Lt/Ha + **ALGASER** a 10 Lt/Ha

Durante cuajado **LIGNOSER** a 50 Lt/Ha + **ALGASER** a 10 Lt/Ha + **LIGNOSER NPK 5-10-5** a 10 Lt/Ha + **LIGNOSER NPK 8-4-16** a 10 Lt/Ha

Durante engorde **ALGASER** a 10 Lt/Ha + **POTASER** a 6 Lt/Ha + **LIGNOSER NPK 8-4-16** a 20 Lt/Ha

Carencias de Hierro **SEQUESTER AMINO 13** a 30-75 g/árbol según gravedad de la carencia.

Carencias de Calcio **LIGNOSER CALCIO** a 6 Lt/Ha - 6 Aplicaciones des de la formación del fruto a la cosecha.



Cultivos con más de 3 años - Aplicaciones Foliares

Antes de Floración **FOSFISER** a 150 g/100 Lt + **ALGASER** a 100 c.c./100 Lt

Durante Cuajado **FOSFISER** a 150 c.c./100 Lt + **POTASER** a 100 c.c./100 Lt + **ALGASER** a 100 c.c./100 Lt

Durante Engorde Fruto hacer varias aplicaciones alternando A y B:

A: **LIGNOSER NPK 8-4-16** a 350 c.c./100 Lt + **ALGASER** a 100 c.c./100 Lt

B: **SERFLOW CA** a 250 c.c./100 Lt + **ALGASER** a 100 c.c./100 Lt



A medio ciclo de Engorde, 2 aplicaciones: **SERFLOW CA** a 250 c.c./100 Lt + **POTASER** a 250 c.c./100 Lt + **ALGASER** a 100 c.c./100 Lt + **SERSTIM** a 100 c.c./100 Lt

En frutales con sobrecarga de frutos, se recomienda aclarar.