

## PLANTACIÓN:

El cultivo del guisante es una planta que no necesita mucha agua.

1er RIEGO después de germinar la semilla: **LIGNOSER NPK 10-5-2** a 3 Lt./1000 m<sup>2</sup>

Hasta el inicio de la Floración (2 a 3 riegos/semana - durante 20 minutos):

**LIGNOSER NPK 8-4-16** a 2,0 Lt/1000 m<sup>2</sup> + **FOSFISER** a 0,3 Kg/1000m<sup>2</sup>

Aprovechando los tratamientos foliares se pueden aplicar los siguientes abonos foliares en esta fase, alternar por semanas A y B:

A: **AMINOSER MIX** a 350 c.c./100 Lt + **FOSFISER** a 0,3 Kg/100 Lt

B: **SERCUAJE** a 300 c.c./100 Lt + **ALGASER** a 100 c.c./100 Lt+ **ANA-AMIDA** a 100 c.c./100 Lt

## DE CUAJADO A FINAL COSECHA:

2-3 riegos por semana de 20 minutos con:

**LIGNOSER NPK 8-4-16** a 2 Lt/1000 m<sup>2</sup> + **POTASER** a 1,0 Lt/1000m<sup>2</sup>

Aprovechando los tratamientos foliares se pueden aplicar los siguientes abonos foliares en esta fase, alternar por semanas A y B:

A: **SERLAC** a 350 c.c./100 Lt + **FOSFISER** a 0,3 Kg/100 Lt + **AMINOSER P** a 0,2 Kg/100 Lt

B: **SERSTIM** a 100 c.c./100 Lt + **ALGASER** a 150 c.c./100 Lt

## PLAGAS Y ENFERMEDADES:

2-3 riegos por semana de 20 minutos con:

**POLILLA DEL GUIANTE:** Tratar con productos autorizados

**PULGÓN VERDE:** tratar con productos autorizados alternando con **JABONSER FOSFÓRICO** a 250 c.c./100 Lt + **JABONSER POTÁSICO** a 200 c.c./100 Lt

**TRIPS DEL GUIANTE:** Tratar con productos autorizados

**PULGÓN VERDE:** tratar con productos autorizados

**ANTRACNOSIS O RABIA DEL GUIANTE:** Ataca los tallos, inicia con manchas redondas amarillas con bordes más oscuros. Pueden afectar a las semillas, y aparecen cuando hay humedad y temperaturas elevadas. Alternar:

**SULFISER** a 350 c.c./100 Lt / **CUPROSER** a 250 c.c./100 Lt / **MANCOZEB**



## PLAGAS Y ENFERMEDADES (continúa):

OIDIO: Tratar con **SULFISER** a 350 c.c./100 Lt (Producto polivalente para Mildiu, Oidio, Alternaria, Arañas,...)

VIRUS DEL MOSAICO: Se distingue en los folíolos, alterna zonas claras y oscuras como en un mosaico. La parte afectada no se desarrolla y se endurece por lo que hay una merma considerable en la cosecha. Se transmite por semillas y por los púgones. Hay que evitar las plagas de púgón.

**SERLAC** a 250 c.c./100 Lt (producto que estimula la división celular)

BOTRITIS, FUSARIUM, SCLEROTINIA:

**FUNGISER** a 250 c.c./100 Lt

**SILICATO POTÁSICO** a 200 c.c./100 Lt

# AGRISER



# PLAN DE ABONADO (RIEGO TRADICIONAL) (i)

# GUISANTES

## PLANTACIÓN:

ABONADO DE FONDO: **COMPLEJO 8-15-15** a 30 Kg/1000 m<sup>2</sup>

El cultivo del guisante no necesita mucha agua, máximo 3-4 riegos durante el cultivo

1er RIEGO después de germinar la semilla: **LIGNOSER NPK 10-5-2** a 6 Lt./1000 m<sup>2</sup>

## RESTO DEL CULTIVO

2º-3º-4º RIEGOS (hasta final del cultivo):

**LIGNOSER NPK 8-4-16** a 8,0 Lt/1000 m<sup>2</sup> + **POTASER** a 1 Lt/1000m<sup>2</sup>

## FOLIARES

Hasta inicio floración, aprovechando los tratamientos foliares, aplicar los siguientes abonos foliares en esta fase, alternar por semanas A y B:

A: **AMINOSER MIX** a 350 c.c./100 Lt + **FOSFISER** a 0,3 Kg/100 Lt

B: **SERCUAJE** a 300 c.c./100 Lt + **ALGASER** a 100 c.c./100 Lt+ **ANA-AMIDA** a 100 c.c./100 Lt

Desde cuajado del fruto hasta el final de la cosecha, alternar por semanas A y B:

A: **SERLAC** a 350 c.c./100 Lt + **FOSFISER** a 0,3 Kg/100 Lt + **AMINOSER P** a 0,2 Kg/100 Lt

B: **SERSTIM** a 100 c.c./100 Lt + **ALGASER** a 150 c.c./100 Lt

## PLAGAS Y ENFERMEDADES:

2-3 riegos por semana de 20 minutos con:

POLILLA DEL GUISANTE: Tratar con productos autorizados

PULGÓN VERDE: tratar con productos autorizados alternando con **JABONSER FOSFÓRICO** a 250 c.c./100 Lt + **JABONSER POTÁSICO** a 200 c.c./100 Lt

TRIPS DEL GUISANTE: Tratar con productos autorizados

PULGÓN VERDE: tratar con productos autorizados

ANTRACNOSIS O RABIA DEL GUISANTE: Ataca los tallos, inicia con manchas redondas amarillas con bordes más oscuros. Pueden afectar a las semillas, y aparecen cuando hay humedad y temperaturas elevadas. Alternar:

**SULFISER** a 350 c.c./100 Lt / **CUPROSER** a 250 c.c./100 Lt / **MANCOZEB**



## PLAGAS Y ENFERMEDADES (continúa):

OIDIO: Tratar con **SULFISER** a 350 c.c./100 Lt (Producto polivalente para Mildiu, Oidio, Alternaria, Arañas,...)

VIRUS DEL MOSAICO: Se distingue en los folíolos, alterna zonas claras y oscuras como en un mosaico. La parte afectada no se desarrolla y se endurece por lo que hay una merma considerable en la cosecha. Se transmite por semillas y por los puzones. Hay que evitar las plagas de puzón.

**SERLAC** a 250 c.c./100 Lt (producto que estimula la división celular)

BOTRITIS, FUSARIUM, SCLEROTINIA:

**FUNGISER** a 250 c.c./100 Lt

**SILICATO POTÁSICO** a 200 c.c./100 Lt

# AGRISER

