

PLANTACIÓN Abonado de Fondo: **ESTIÉRCOL** a 50 Tm/Ha + **FÓSFORO** a 300 Kg/Ha + **POTASIO** a 600 Kg/Ha

Cultivos con más de 3 años - Fertirrigación:

Aporte de Materia Orgánica **LIGNOSER** a 200 Lt/Ha a la salida del invierno
LIGNOSER a 100 Lt/Ha durante el cuaje del fruto

PRE-FLORACIÓN Antes de la Floración: 2 aplicaciones en riego con **LIGNOSER NPK 10-5-2** a 20 Lt/Ha + **ALGASER** a 5 Lt/Ha

CUAJADO FRUTO Durante el cuajado: 2 aplicaciones en riego con **LIGNOSER NPK 10-5-2** a 10 Lt/Ha + **LIGNOSER NPK 5-10-5** a 10 Lt/Ha + **AMINOSER P** a 2,5 Kg/Ha

ENGORDE FRUTO Durante engorde hasta cosecha: 2-4 aplicaciones con **LIGNOSER NPK 9-4-16** a 20 Lt/Ha + **POTASER** a 4 Lt/Ha

CARENCIAS DE HIERRO **SEQUESTER AMINO 13** a 25-50 Gramos / planta y año dependiendo de la gravedad.

CARENCIAS DE CALCIO Desde la formación del fruto hasta la cosecha: de 3 a 6 aplicaciones en riego de

LIGNOSER CALCIO a 10 Lt/Ha

De 2 a 3 aplicaciones foliares de

SERFLOW CA a 250 c,c/Hl + **AMINOSER P** a 200 g / 100 Lt

