PLAN DE ABONADO (i) PIMIENTO

INICIO PLANTACIÓN

1 riego: RAISER a 0,2 Lt/1000 m2 + SERLAC a 0,20 Lt/1000 m2

Prevención hongos de suelo: FUNGISER a 6 Lt / Ha (repetir cada 20 días)

1ª a 2ª semana: LIGNOSER NPK 5-10-5 a 1,5 Lt / 1000 m2 (a las dos semanas aumentar a 2,0 Lt/1000m2)

VEGETACIÓN

A partir de la tercera semana después de plantación alternar abonado A y B:

A: FOSFISER a 0,3 Kg/1000 m2 + LIGNOSER NPK 8-4-16 a 1,5 Lt/1000 m2 + SULFATO MAGNÉSICO a 0,3 Kg/1000 m2 + LIGNOSER a 1,0 Lt/1000 m2

B: LIGNOSER CALCIO a 1,5 Lt/1000m2 + LIGNOSER NPK 8-4-16 a 0,5 Lt/1000m2 + SERMIX PLUS a 0,2 Kg/1000m2

FLORACIÓN Y CUAJADO

Esta recomendación se aplica solo 1-2 veces para provocarle una floración fuerte. Aplicar 2 riegos consecutivos:

RIEGO: FOSFISER a 0,5 Kg/1000m2 + SERCUAJE a 0,25 Lt/1000m2 + SERSTIM a 0,125 Lt/1000m2

Durante esta misma fase aplicamos por via foliar:

FOLIAR: SERFLOW CA a 200 c.c./100 Lt + SERCUAJE a 200 c.c./100 Lt+ ALGASER a 200 c.c./100 Lt

ENGORDE

Hasta final del cultivo, alternar riegos A, B y C, una vez cada uno, añadiendo en los tres riegos: LIGNOSER a 1,0 Lt / 1000 m2

A: LIGNOSER NPK 10-5-2 a 1,5 Lt/1000 m2 + FOSFISER a 0,3 Kg/1000 m2 + AMINOSER P a 0,2 Kg/1000 m2

B: LIGNOSER CALCIO a 1,5 Lt/1000 m2 + POTASER a 400 c.c./1000 m2 + SERMIX PLUS a 0,15 Kg/1000 m2

C: LIGNOSER NPK 8-4-16 a 1,5 Lt/1000 m2 + NITRATO POTÁSICO a 1,5 Kg/1000 m2 + SULFATO MAGNÉSICO a 0,2 Kg/1000 m2

TRATAMIENTOS ADICIONALES PARA POTENCIAR EL CUAJE Y ENGORDE (2 aplicaciones foliares cada 15 días)

BOROSER a 150 c.c/100 Lt + SERSTIM a 100 c.c./100 Lt + ALGASER a 200 c.c./100 Lt + SERFLOW CA a 300 c.c./100 Lt



PLAN DE ABONADO (ii)

PIMIENTO

PREVENCIÓN ENFERMEDADES

Vasates, Araña Roja, Mosca Blanca

JABONSER ECO	a 600 c.c./100 Lt
SULFISER	a 300 c.c./100 Lt
JABONSER FOSÓRICO	a 300 c.c./100 Lt

Prevención de nemátodos y fotalezimiento de la raíz: NEMASER a 14 Lt/1000 m2 - repartir 20% en la2ª semana del trasplante, resto cada 20 días

Prevención de Verticillium, Pythium, Rhizoctonia, Fusarium : FUNGISER a 3 Lt/1000 m2 - repartir 3 aplicaciones durante el cultivo a 1 Lt/1000m2 cada aplicación

Alternariosis, Mildiu, Oidio, Bacteriosis: aplicar rotando cada semana un producto:
CUPROSER a 300 c.c./100Lt / SULFISER a 300 c.c./100Lt / FOSFISER a 150 c.c./100Lt .
Incorporar AMINOSER o ALGASER

Se puede incrementar con Folpec, Rovral, Mancozeb u otros.

