Guía de fertilización Pepino

Producción ecológica



Abonado de fondo

- DUALSPORE NPK 8-4-10 — 500 Kg / Ha

Plan de preparación y mejora del suelo (Hongos y nematodos)

Aplicar el día anterior al trasplante

- NEMASER — 20 L / Ha
- FUNGISER HG — 20 L / Ha

Trasplante

Primer riego (Única aplicación)

- AGILUS BIO — 1 L + 200 L agua / Ha
- SERLAC — 3 L / Ha

Segunda semana (Única aplicación)[1]

- RADIXER — 10 L / Ha
- FUNGISER — 10 L / Ha

Vegetación

Empezaremos esta fase a las dos semanas de haber plantado.

Todas las semanas aportar

- LIGNOSER — 20 L / Ha

Alternar riego A con B

Tratamiento A

- FOSFOSER ECO — 5 L / Ha
  - ECOSER P (*pendiente de certificación)* — 5 L / Ha
- AMINOSER — 10 L / Ha
  - ECOSER N *(pendiente de certificación)* — 10 L / Ha
- MAGSER HG-L — 2 L / Ha

[1] Se recomienda realizar una segunda aplicación luego de comenzar la recolección.



Tratamiento B

- CALCISER HG-L 6 L / Ha
- POTASER ECO 5 L / Ha
- SERMIX PLUS 2 kg / Ha

Floración

Riego, se recomienda entre uno y dos aplicaciones[2]

- AMINOSER 10 L / Ha
    - ECOSER N *(Pendiente de certificación)* 10 L / Ha

- SERCUAJE ECO 3 L / Ha
- ALGASER 1.5 L / Ha

Foliar

- CALCISER HG-L 250 cc / Hl
- SERCUAJE ECO 200 cc / Hl
- ALMINOLAC BET 150 cc / Hl

Una vez cuajados los tres primeros frutos

Dos aplicaciones foliares

- SERCUAJE ECO 200cc / Hl

Acompañadas con

- CALCISER HG-L 6 L / Ha
- POTASER ECO 300 cc / Hl
- AMINOSER 10 L / Ha
    - ECOSER N *(pendiente de certificación)* 10 L / Ha

*Luego hasta plena producción alternamos con los siguientes tratamientos**

Tratamiento A

- AMINOSER 10 L / Ha
    - ECOSER N *(pendiente de certificación)* 10 L / Ha
-
- POTASER ECO 8 L / Ha
- SERMIX PLUS 2 kg / Ha

[2] Induce la floración



Tratamiento B

- CALCISER HG-L 6 L / Ha
- POTASER ECO 10 L / Ha
- MAGSER HG-L 3 L / Ha

*Se puede incorporar con estos riegos LIGNOSER (15 L / Ha)

Inducción del rebrote

Una aplicación

- FUNGISER 10 L / Ha
- ALGASER 200 cc / Ha
- SERCUAJE ECO 300 cc / Ha
- AMINOLAC BET 200 cc / Ha

Tratamientos adicionales

Dos aplicaciones foliares cada 15 días

- BOROSER 150 cc / Hl
- AMINOLAC 300 cc / Hl
- ALGASER 200 cc / Hl

Control de en casos especiales

Larvas

Aplicación foliar

- KINGSER 400 cc / Hl

Pulgones

Aplicación foliar

- SERACE 400 cc / Hl

Arañas

Aplicación foliar

- JACKSER 400 cc / Hl



Trips

- QUEENSER 400 cc / Hl
- SERZYME 80 gr / Hl

Insectos en general

- PROTENDO 1 L + 1 L ACTIVE ON / Ha
- SULFISER HG-L 350 cc / Hl

Botrytis, Mildiu, Alternaria, Oidio, Roya, Etc.

Combinación sugerida 1

- BOTRIMAX 200 cc / Hl
- OIMISER 50 gr / Hl

Combinación sugerida 2

- MIBOSER de 80 a 150 cc / Hl
- BIOTYL 200 cc / Hl

Bacterias

- CUPROSER BAC 200 gr / Hl

Virus

- SERLAC V 500 cc / Hl
- SERLAC V EXTREME (casos más graves) 500 cc / Hl
- AMINOLAC BET 200 cc / Hl